

NÁVOD NA PĚSTOVÁNÍ JIŘIN Z MLADÝCH ROSTLIN

JIŘINY jsou hlíznaté květiny kvetoucí po celé léto až do příchodu prvních podzimních mrazů, které ukončí jejich vegetaci. Vyznačují se bohatým květenstvím, rozmanitostí tvarů květů a širokou škálou barev. Mladé rostliny jiřin jsou zakořenělé řízky vypěstované z vybraných matečních hlíz. Jejich předností je velká energie růstu s vyrovnaným nástupem květenství.


STANOVIŠTĚ pro pěstování jiřin volíme s celodenním osluněním. V polostínu pod stromy se rostliny vytažují a málo kvetou. Nároky na druh půdy nemá jiřina vyhraněné, ale dobrému růstu prospívá strukturní půda s dobrou zásobou živin. Toho docílíme, když se na podzim zaryje rozložený hnůj. Pokud sázíme do půdy, která nebyla připravená na podzim, je potřebné obnovit strukturu půdy zapravením zahradnického substrátu s přidáním 30 – 40 g/m² Cereritu nebo jiného plného hnojiva.

DOBA VÝSADBY připadá do období po přechodu pozdních jarních mrazíků po 10. květnu. Dřívější výsadba je možná jen tam, kde nehrozí poškození mladých rostlin přzemními mrazíky nebo když vysázené mladé rostliny jiřin můžeme na noc přikrýt fóliovým krytem nebo nádobou. Další možností je předpěstování mladých rostlin ve skleníku nebo ve fóliovníku. Zde se může docílit ranějšího květenství než u jiřin pěstovaných z hlíz. Pokud se takto předpěstovávají mladé rostliny jiřin, je potřebné je nasázet do květináčů o průměru nad 12 cm a vystavět je na fólii nebo textílii, aby nedošlo k prokořenění do záhonu.

PĚSTOVÁNÍ mladých rostlin není náročné. K dobrému růstu však potřebují dostatek vláhy a živin. Pokud se jim toho dostane, jsou schopny vykvést za 6 – 8 týdnů od data výsadby. To záleží na výšce odrůdy a její ranosti. **VZDÁLENOST** výsadby mladých rostlin jiřin se řídí výškou odrůdy, která je uvedena v nabídkovém seznamu za názvem odrůdy a skupinou, do které náleží. Odrůdy ze skupiny velkých dekoračních a další skupiny odrůd, dosahující výšky 120 cm, vysazujeme na vzdálenost 70 – 80 cm. Odrůdy do výšky 100 cm sázíme na vzdálenost 60 – 70 cm a nejnižší odrůdy dosahující výšky do 60 cm na vzdálenost 30 – 40 cm výsadby. **K POUŽITÍ** pro výsadbu jako solitera se hodí všechny odrůdy jiřin, nejvíce však skupina dekoračních. Pro výsadbu do nádob doporučujeme jen skupinu parkovek do výšky 60 cm.

PRVNÍ PŘIHNŮJENÍ po výsadbě mladých rostlin jiřin provedeme po 10 dnech Ledkem amonným v dávce 5 g/m² a další ve stejné dávce za 10 dnů. Při dostatečné závlivce, která je hlavní podmínkou úspěšného pěstování jiřin, vyrostou během měsíce rostliny dosahující výšky 20 – 30 cm. V této době provedeme v 10 – 14-ti denním intervalu ještě 2krát přihnojení plným hnojivem jako je Cererit v dávce 20 g na 10 litrů vody. **OPORA** jiřinového keře proti rozlomení, ke kterému může dojít následkem silných dešťů a větrů koncem léta,

je nutná u odrůd, které jsou vyšší jak 60 cm. To můžeme provést pomocí opěrného kolíku, ke kterému v průběhu narůstání keře 2krát motouzem přivážeme rostlinu. Výška kolíku nad povrchem stačí do 60 cm. Cílem je, aby v co nejkratší době byl opěrný kolík zakryt keřem jiřiny. Jinou možností ukotvení keře je použití opěrného kruhu, který zabodneme nad střed rostliny ve výšce 20 cm nad povrchem půdy. Prorůstající výhony se opřou o vnitřní část kruhu a celý jej postupně zakryjí. S postupujícím růstem povytáhneme opěrný kruh z půdy o 10 cm. Tím se zakotví všechny hlavní výhony tvořící keř jiřiny. Předností opěrného kruhu je dobré ukotvení jiřinového keře a rychlé zakrytí opěry v porovnání s vyvazováním ke kolíku. Opěrných kruhů se dá také využít pro pokládání fólie jako ochrany před mrazem při raných



výsadbách. Na zhotovení kruhu je potřeba 1,8 m drátu o síle 0,8 mm. První květenství se dostavuje za 6 až 8 týdnů po výsadbě. Vše záleží na ranosti odrůdy a podmínkách, ve kterých jsou pěstovány. Pokud chceme vypěstovat květy bez konkurenčních poupat, provádíme vylamování postranních výhonků vyrůstajících z paždí listů.

VYLAMOVÁNÍ provádíme u prvního a druhého listu od hlavního poupěte, a to dokud jsou výhonky málo narostlé, nejlépe do 5 cm délky. Květy takto vypěstované dorůstají větších průměrů a mají vyšší estetickou hodnotu jak na keři jiřiny, tak nařezané ve váze. Tohoto ošetření se používá pro výstavní účely a jenom u odrůd, které se k tomuto hodí. Jedná se především o velkokvěté odrůdy, u nichž postranní poupata konkurují hlavnímu květu. Vylamování je zbytečné u odrůd kvetoucích na kratších stopkách, které jsou méně vhodné k řezu. Posledním ošetřením jiřin v průběhu vegetace je



ODŘEZÁVÁNÍ ODKVĚTAJÍCÍCH KVĚTŮ. Jiřina je velice produktivní květina co se týče růstu keře a tvorby květů. Řez květů podporuje další růst nových květních výhonů. Pokud však jiřiny mají sloužit k okrasě zahrady, je vhodné včas odřezávat odkvétající květy, které uvolňují květní plátky a padají do keře. Ty nejenže nejsou žádnou ozdobou rostliny, ale způsobují při závlivce postřikovačem nebo při vlhkém podzimním počasí plesnivění listů. Zde platí odřezat uvadající květ raději o dva dny dříve než o jeden den později. Pokud se nestihne řez, odlámou se hlavy uvadajících květů a stopky se ořežou později. Odlamování se provádí boku proti směru postavení květu na stopce. Tohoto způsobu ošetření se nejvíce používá u skupiny parkovek, kde není potřeba odřezávat stopky, protože jsou rychle zakryty přerůstajícími novými květy.

S příchodem prvních podzimních mrazíků, když dojde k pomrznutí keře jiřiny, začínáme se sklízet hlízy. **SKLIZEŇ HLÍZ JIŘIN** by měla být provedena v našich klimatických podmínkách do konce měsíce října. Jiřiny lze vyklidit ze záhonu i v měsíci září, když mrazíky popálí rostliny, a na uvolněné místo se vysadí například macešky. Hlízy z tohoto termínu sklizně jsou ale většinou nenarostlé a při skladování seschnou. Správné datum pro sklizeň dobře narostlých hlíz je 5 až 10 dnů po celkovém zmrznutí keře jiřiny, kdy již nemohou do hlízy proudit zásobní látky. Sklizeň provádíme tak, že napřed odstříhneme celý keř 5 cm nad povrchem půdy. Potom odstraníme oporu a hlízu



vyryjeme. Ke krčku hlízy hned připevníme jmenovku se jménem a popisem odrůdy. Hlízy očištěné od zeminy vyskládáme do bedýnek a necháme podle potřeby týden až dva týdny dosušit a zatáhnout při teplotě cca 10° C. **SKLADOVÁNÍ** hlíz jiřin má být při teplotě + 8° C v místnosti, kde neproudí vzduch. Tyto optimální podmínky jsou někdy nedostupné, a proto se hledá kompromis. Všeobecně známé zakládání do pilin nebo do rašeliny může nahradit papírový pytel, který se po naplnění hlízami neочиštěnými od zeminy jen uzavře. To platí pro skladování při vyšších nebo kolísajících teplotách. Při uskladnění v nižších teplotách než je optimum dbáme opět nato, aby hlízy nevysychaly a před výsadbou je necháme o měsíc dříve narašit v teplejším prostředí. V průběhu skladování je dobré provést kontrolu hlíz, zda nezačaly plesnivět nebo pohnívat. Pokud k tomu dojde, očistíme je, případně zkrátíme krček hlízy a zasypeme je prachem z dřevěného uhlí nebo použijeme fungicidní přípravky jako je Merpan 80 WP, Topas CWP, Acrobat MZ nebo Ridomil MZ 72 WP.

**Při pěstování jiřin
Vám přejeme
mnoho úspěchů.**



Langrovo zahradičství

specializované na pěstování jiřin
679 02 Rájec-Jestřebí
Telefon: 516 432 032

Webové stránky: www.jirinylangr.cz
E-mail: langr@jirinylangr.cz